



Nedovoljno izmešan rastvor i nečista prskalica dovode do oštećenja i uništavanja useva repe

Najvažniji korovi



Čičak



Ambrozija



Palamida



Pomoćnica



Amaranthus



Poligonum



Poljska gorušica



Tatula obična



Štir



Abutilon



Pepeljuga



Divlji sirak

**MOLIMO VAS DA PRAVILNO PRIMENJUJETE
PREPARATE, POŠTUJETE ZAKONSKE ODREDBE
I KORISTITE PREPARATE SA EU-LISTE
DOZVOLJENIH PESTICIDA!!!**

**Za sva pitanja pozovite Vašeg
savetodavca iz Agroservisa Sunoko:**

mob. _____

Flajer je štampan iz sredstava PPP-projekta koji je sufinansiran od strane DEG sa državnim sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.



Sunoko

ZAŠTITA OD KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI

Suzbijanje širokolisnih korova

Korovi nanose najviše štete u toku prvih 8 nedelja nakon nicanja šećerne repe. Zavisno od vrste i brojnosti korova u tom periodu, mogu dovesti do smanjenja prinosa i do 80%.

Zbog toga parcele u tom periodu moraju biti čiste od korova.

Najvažnije je prskati dok su korovi u fazi kotiledona

Ciljano post em. Tretiranje - Termini prskanja:

1. Termin: 1. post em. (kotiledoni)

- kada niknu prvi korovi
- nezavisno od veličine repe



3. Termin: 3. post em.

- cca. 10 - 14 dana kasnije

2. Termin: 2. post em.

- cca. 10 dana kasnije
- nezavisno od faze razvoja repe
- voditi računa samo o spektru korova

April 2010.

Kombinacija herbicida se utvrđuje na osnovu spektra korova koji je prisutan na određenoj parceli.

Primer 1: Preporuka za tretiranje			
Abutilon, Tatula, Dvornici, Štir, Lubeničarka			
Tretiranje	Preparati	kotiledoni	kotiledoni - - 4 prava lista
Prvo	Betanal AM 11 New	0,6	0,8 - 1,0
	Safari (+ Trend)	30 g	30 g
	Goltix	1,0	1,0
Drugo i treće	Betanal Expert	0,7	1,0 - 1,3
	Safari (+ Trend)	30 g	30 g
	Goltix	1,0	1,0

Primer 2: Preporuka za tretiranje			
Ambrozija, Tatula, Samonikli suncokret, Čičak, Palamida			
Tretiranje	Preparati	kotiledoni	kotiledoni - - 4 prava lista
Prvo	Betanal AM 11 New	0,6	1,0
	Lontrel 100	0,6	0,6 - 0,7
	Goltix	1,0	1,0
Drugo i treće	Betanal Expert	0,7	1,0 - 1,25
	Safari (+ Trend)	30 g	25 - 30 g
	Lontrel 100	0,5	0,6 - 0,7
	Goltix	1,0	1,0

Zbog smanjenja rizika od oštećenja šećerne repe, savetujemo da se Betanal expert (odn. Nortron super) ne koristi u prvom prskanju.

Ako se koristi Betanal Expert u I tretmanu, a biljke su pod stresom, dozu smanjiti za 20%.

Samostalnim mešanjem preparata mogu se postići značajne uštede:

Zamena za Betanal Expert:	Betanal Expert:	
	1 liter (70 FMF + 90 DMF + 110 ETF)	1,5 liter (105 FMF + 135 DMF + 165 ETF)
Betanal AM 11 new (160g FMF + 160g DMF)	0,6	0,9
Nortron super (500g ETF)	0,2	0,3
Synbetan Mix (80g FMF + 80g DMF)	1,3	1,8
Nortron super (500g ETF)	0,2	0,3

Suzbijanje travnih korova

	Semenski do 5 cm	Rizomski	Uz dodatak 3 dl Trendera
Agil	0,6	1,0	0,9
Gallant super	0,6	1,0	0,9

Tehnika prskanja

- ne prskati po vrućini (preko 25°C)
- ne prskati između 9 i 20 h kada je toplo i sunčano
- u sušnim uslovima prskanje rano ujutro je 10% efikasnije nego uveče

Tolerantnost repe u zavisnosti od vremenskih uslova pre i posle njihove primene

Vreme pre prskanja	Očekivano vreme nakon prskanja			
	15-18°C, velika verovatnoća za kišu	do 25°C, oblačno preko dana	do 25°C, veoma sunčano ili >25°C, ali pre oblačno	>30°C
poslednja kiša mnogo više od 2 dana pre, sunčano vreme				
poslednja kiša pre 2 dana, oblačno, slab vetar				
poslednja kiša pre 2 dana, jako oblačno, bez vetra, event. 1-2 puta slaba kratkotrajna kiša				
poslednja kiša pre 1 dana pre, sunčano vreme, razlika dnevno-noćna temp. >15°C				

- = bez rizika po biljku
- = ne koristiti ulja
- = ne koristiti ulja, maksimalno mešati dva herbicida
- = ako je moguće prskanje odložiti za kasnije
- = ne prskati

Ako dan pre prskanja padne > 5mm kiše, doze se mogu smanjiti za 15 – 20%, potrošnja vode 180 - 250 l/ha.

Ako korovi prerastu osetljivu fazu

Kapi ne treba da su suviše fine niti velike.

NE TREBA POVEĆAVATI DOZU PREPARATA, već podeliti jednokratnu dozu na dva dela i prskati dva puta u razmaku od 3 - 4 dana i menjati smer prskanja od jednog do sledećeg prskanja.

Priprema rastvora u prskalici

- Preparati se počinju dodavati u prskalicu kada je rezervoar do 1 napunjen vodom.
- Mešač mora biti uključen neprestano!
- Najpre se dodaje Betanal, a nakon nekoliko minuta mešanja i ostali herbicidi.
- Rezervoar prskalice dopuniti preostalom količinom vode.
- Okvašivač se dodaje na kraju.